

HOW TO USE THE BOLIFOR PACK/HOE OM DIE BOLIFOR-PAK TE GEBRUIK

The following process should be started one day (approximately 24 hours) prior to the intended dosing of Megamilk to the cow. Steps 1 to 5 should be performed within approximately 30 minutes to prevent delays from opening of outer-bag until start of incubation.

Die volgende proses moet een dag (sowat 24 uur) voor die beoogde dosering van Megamilk aan die koei plaasvind. Stappe 1 tot 5 moet binne sowat 30 minute uitgevoer word om enige vertraging vanaf die oopmaak van die buitesak tot die begin van inkubasie te voorkom.

REMEMBER to switch on the incubator!
ONTHOU om die inkubator aan te skakel!

1/ Tear outer-bag open along dotted line. Do not cut open with any sharp object, as this may puncture the inner-bag!

Skeur die buitesak op die stippellyn oop. Moenie met enige skerp voorwerp oopsny nie, want dit kan die binnesak beskadig!

2/ Remove inner-bag from outer-bag.

Verwyder die binnesak uit die buitesak.

3/ Grip inner-bag firmly at the two corners on the side of the larger compartment.

Vat die twee hoeke aan die kant van die groter kompartement stewig vas.

4/ Squeeze the inner-bag hard to break the centre seal and then turn bag around gently three times to allow the contents of both compartments to mix.

Druk die binnesak hard om die seël tussen die kompartemente te breek, en draai die sak dan versigtig drie keer in die rondte om die inhoud van beide kompartemente te meng.

5/ Place the inner-bag in the incubator (which must already be on temperature, 39 °C) and allow approximately 24 hours for the fermentation process to be completed, i.e. for the bag to become fully inflated.

Sit die binnesak in die inkubator (wat reeds op temperatuur moet wees, 39 °C) en laat sowat 24 uur toe vir fermentasie om te voltooi, met ander woorde vir die sak om heeltemal op te blaas.

6/ After approximately 24 hours, remove the inflated bag from the incubator and cut open at the upper corner. The opening should only be large enough to allow easy insertion of syringe. Once opened, the contents of the bag must be used without delay.

Verwyder die opgeblaasde sak ná sowat 24 uur uit die inkubator en sny by die boonste hoek oop. Die opening moet slegs groot genoeg wees vir die spuitpunt om gemaklik ingedruk te word. Die inhoud van die sak moet sonder enige ophoud gebruik word nadat dit oopgemaak is.

7/ Insert point of syringe into bag and pull total contents of bag up into syringe.

Druk die spuitpunt in die sak in en trek die volle inhoud van die sak in die spuit op.

8/ Use the contents of the syringe as a single oral dose to the cow.

Dien die inhoud van die spuit aan die koei toe as 'n eenmalige mondelingse dosering.

Once the bag is fully inflated, i.e. fermentation is completed, the contents must be used within 12 hours.

Wanneer die sakkie ten volle opgeblaas is, m.a.w. fermentasie is voltooi, moet die inhoud van die sakkie binne 12 ure gebruik word.



DISCLAIMER

This product must be handled, stored and used with all reasonable care and strictly in accordance with the instructions indicated on the package of this product and/or given by the manufacturer Kemira Phosphates (Proprietary) Limited or any authorised distributor within the specified scope of application. Kemira Phosphates (Proprietary) Limited warrants that the product conforms to the specifications indicated on the package but makes no warranty as to the merchantability or fitness for a particular purpose nor any other warranty express or implied. The foregoing warranty is in lieu of all other warranties and conditions express or implied.